ESPÈCES ET GENRES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES *SPARASSIDÆ*,

Par Eugène SIMON.

Sectio **Selenopini.**

1. Selenops atomaria *sp. nov.*, ♀ long. 10mm5.

Cephalothorax fere lævis, obscure fulvo-rufescens, in regione oculorum infuscatus et subniger, pilis simplicibus longis albidis flavidisque vestitus, parte cephalica levissime canaliculata. Oculi quatuor medii antici in linea valde recurva, medii duo paulo minores inter se spatio diametro oculi vix angustiore sejuncti sed a lateralibus vix separati. Abdomen magnum sat convexum, antice recte truncatum, postice obtusum, fulvo-cinereum, supra parcissime et inordinate nigro-punctatum. Sternum luridum parce albido-pilosum. Chelæ rufescentes, nitidæ, valde hirsutæ. Pedes parum longi, fulvo-rufescentes, femoribus supra confuse cinereo maculatis. Tibiæ anticæ aculeis inferioribus 5-5, metatarsis 3-3 armati. Plaga vulvæ semicircularis, rufula, subtiliter coriacea, carinis duabus longitudinalibus inverse arcuatis notata.

♀ long. 8mm. — Pedes multo longiores, tibiis anticis aculeis inferioribus ut in femina atque aculeis lateralibus paucis armatis. Pedes-maxillares fulvi, tarso infuscato, patella longiore quam latiore subparallela, tibia patella paulo longiore ad basin paulo angustiore extus ad apicem bicalcarata, calcare inferiore rufulo lamelloso et subpellucenti antice arcuato et subacuto, superiore nigro usque ad basin valde bifido, ramulis duabus divaricatis subæquis et acutis, tarso mediocri anguste ovato, bulbo oblongo plicato intus stylo marginato.

Africa Australis : Pt Elisabeth (Bairstow).

2. Selenops pusilla *sp. nov.* ♀ long. 5mm6.

Cephalothorax obscure fuscus, squamulis lanceolatis obscure fulvis dense vestitus. Oculi medii antici lateralibus non multo

majores et inter se latius quam a lateralibus remoti. Abdomen depressum subquadratum, antice posticeque fere recte sectum, supra squamulis rotundis imbricatis fusco-rufulis dense vestitum, et postice vitta transversa lata albido-squamulata marginatum, subtus in medio cinereo-olivaceo ad marginem albido-flavescenti squamulatum. Sternum latum, fulvum, squamulis elongatis pronis ornatum. Laminæ vix impressæ. Pedes obscure fulvi fulvo-squamulati et parce setosi, postici infuscati, femoribus cunctis supra late fusco triannulatis. Tibiæ anticæ inferne aculeis biseriatis 2-3, exterioribus tribus longioribus, armatæ. Plaga vulvæ fusca, nitida sat magna, in medio profunde foveolata, postice obtuse canaliculata, fovea media plagulam rotundam testaceam postice breviter et acute productam includente.

Nossi-Bé (Legras).

3. Selenops Legrasi *sp. nov.* ♀ long. 12mm5.

Cephalothorax obscure fusco-rufescens, subtilissime rugosus, squamulis crassis pronis fuscis vestitus, vitta marginali validissime sinuoso-dentata et prope medium utrinque maculis elongatis radiantibus sordide albido-squamulatis ornatus. Oculi quatuor medii antici fere æquidistantes, medii duo reliquis fere duplo majores. Abdomen subquadratum, antice recte postice obtuse truncatum, supra atrum, dense fusco-olivaceo-squamulatum, lineis sinuosis abbreviatis longitudinalibus et prope medium tranversis fere inordinate notatum, postice vitta lata transversa flavescenti-squamulata marginatum. Sternum longius quam in præcedenti, olivaceo-squamulatum. Laminæ intus longitudinaliter profunde impressæ. Chelæ fusco-rufulæ, nitidæ, ad basin valde convexæ et geniculatæ. Pedes robusti, fusco-olivacei, femoribus, præsertim anticis, obscurioribus sed antice maculis tribus obliquis albido-squamulatis ornatis, reliquis articulis in articulationibus squamulis albidis notatis. Tibiæ anticæ aculeis inferioribus biseriatis, serie interiore ex aculeis 2, exteriore ex aculeis inæqualibus 5-7. Plaga vulvæ nitida, fovea magna, postice attenuata et obtuse triquetra, utrinque costa obsoleta et in medio sulco exili longitudinaliter secta, notata.

♂ long. 10mm. — Pedes multo longiores. Pedes-maxillares olivacei, patella subquadrata, tibia patella circiter æquilonga, valde attenuata et leviter intus inflexa, extus ad basin valde convexa et apophysibus duabus depressis obtusis et subgeminatis munita,

apophysi superiore extus curvata et subplicata subtus excavata et acute marginata, inferiore valde infra directa supra in parte basilari alte carinata, tarso lato breviter ovato et convexo, bulbo lamina magna intus marginato in medio calcaribus duobus superiore paulo longiore et uncato armato.

Nossi-Bé (Legras).

Sectio **Cebrennini.**

Genus CEBRENNINUS nov. gen.

Cephalothorax vix longior quam latior, parte cephalica vix attenuata, antice recte truncata, validissime convexa et postice impressionibus divaricatis profunde discreta, parte thoracica humiliore ampliata, medio profunde canaliculata. Oculi postici in linea valde recurva, medii lateralibus plus triplo minores et a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi antici in linea evidenter recurva angustiore quam linea secunda fere æquidistantes, medii lateralibus plus quadruplo minores. Area mediorum fere æque longa ac lata et antice quam postice multo angustior. Oculi laterales prominuli. Clypeus oculis anticis multo latior. Chelæ robustæ et convexæ. Pars labialis longior quam latior, versus apicem leviter attenuata atque obtusa. Laminæ leviter arcuatæ. Pedes modice longi 2, 1, 4, 3, haud scopulati, aculeati sed metatarsi 4^{i} paris, aculeis terminalibus exceptis, mutici.

A gen. *Cebrenno* præsertim differt pedibus haud scopulatis, oculis mediis posticis lateralibus plus triplo minoribus et oculis anticis lineam recurvam formantibus.

4. Cebrenninus rugosus *sp. nov.* ♂ long. 5^{mm}5.

Cephalothorax subniger, granulis grossis, in parte cephalica inordinatis in parte thoracica seriatim dispositis munitus et setis fulvis robustis et brevibus parce ornatus. Abdomen breviter ovatum, supra atro-cinereum testaceo-punctatum, antice vitta longitudinali lanceolata, utrinque serie macularum, postice lineolis transversis testaceis ornatum, subtus testaceum fusco-variatum. Sternum fuscum tenuiter rugosum. Chelæ nigro-castaneæ leviter rugatæ. Pedes modice longi et robusti lurido-testacei, patellis fuscis, femoribus tibiis metatarsisque late fusco biannulatis. Pedes maxillares mediocres, obscure fulvi, femore gracili arcuato,

patella vix 1/3 longiore quam latiore subparallela, tibia patella paulo breviore, extus apophysi subinferiore magna cylindrata et divaricata sed prope apicem abrupte angustiore antice inflexa et acutissima instructa, tarso tibia parum latiore, longe acuminato, bulbo ovato disciformi apice processubus duobus styliformibus nigris, medio recto et gracillimo, exteriore minute uncato, armato.

Sumatra.

Sectio **Clastini.**

Comprenant les genres *Clastes* Walck., *Pandercetes* L. Koch, *Spariolenus* E. Sim., et *Adrastis* E. Sim.

Genus PARHEDRUS nov. gen.

Cephalothorax longior quam latior, ovatus, parte cephalica sat lata vix elevata, stria thoracica profunda et longa, radiantibus parum expressis. Oculi postici in linea sat valde recurva, medii a lateralibus quam inter se remotiores, laterales mediis multo majores et late elevati. Oculi antici approximati, in linea procurva, medii lateralibus plus triplo minores, area mediorum longior quam latior et antice quam postice angustior, medii antici posticis paulo minores. Clypeus altissimus verticalis, oculis anticis sal tem triplo latior. Chelarum margo inferior quadridentatus, dente quarto fere obsoleto. Pedes longi, sat graciles, 1, 2 et 4 subæquales, 3 breviores, aculeis longissimis instructi. Tarsi metatarsique sat dense scopulati.

Gen. *Adrastidi* E. Sim. vicinus, differt cephalothorace paulo convexiore, oculorum serie antica procurva (in *Adrastidi* recta), clypeo multo altiore oculis anticis plus duplo latiore (in *Adrastidi* oculis anticis angustiore).

5. Parhedrus ocyalinus *sp. nov.* ♀ long. 14^{mm}.

Cephalothorax fusco-rufescens, lineis radiantibus ramosis obscurioribus notatus, fulvo-pubescens, utrinque vitta marginali latissima recta longe albido-pilosa ornatus. Abdomen anguste elongatum, postice sensim attenuatum, supra fuscum testaceo marginatum, vitta media integra testaceo-livida, prope apicem arcubus fuscis minutis 2 vel 3 secta, ornatum, subtus omnino testaceum. Sternum et partes oris pallide lurida. Chelæ fusco-lividæ fulvo albidoque hirsutæ. Pedes longi sat graciles, fusco-rufes-

centes, coxis tarsisque dilutioribus et fulvis, fulvo-pubescentes et præsertim in femoribus, punctis maculisque parvis albido-pilosis inordinatim picti. Tibiæ anticæ aculeis inferioribus longissimis 3-3, metatarsi aculeis inferioribus similibus 2-2 atque aculeis lateralibus paucissimis armati. Pedes-maxillares fulvi parce et inordinate fusco-punctati. Plaga vulvæ paulo latior quam longior, utrinque recta, antice posticeque levissime emarginata, carina media sat lata rugosa et parallela sed ad apicem abrupte angustiore et utrinque plagula ovata fusco-nitida, notata. — Java.

Sectio **Sparassini.**

Comprenant les genres *Sparassus* Walck., *Olbus* E. Sim., *Nonianus* E. Sim., *Nisueta* E. Sim., *Olios* Walck., *Midamus* E. Sim., *Vindullus* E. Sim., *Sarotes* Sund., *Sadala* E. Sim.

Genus MACRINUS nov. gen.

Gen. *Olios* et præsertim *Midamo* valde affinis. Ab *Olios* differt præsertim oculis anticis subcontiguis et mediis lateralibus multo majoribus. A *Midamo* differt pedibus posticis anticis multo brevioribus (in *Midamo* pedibus I et IV parum inæqualibus).— Cephalothorax saltem haud longior quam latior sat convexus. Oculi postici in linea plane recta æqui, æquidistantes. Pedes (saltem in ♂) longi et graciles, leviter scopulati, valde inæquales, 2, 1, 4, 3, antici quatuor posticis longiores (patella et tibia IV simul sumptæ haud longiores quam tibia II).

6. MACRINUS SUCCINEUS *sp. nov.* ♂ long. 11mm.

Cephalothorax pallide fulvo-rufescens, albido-sericeo pubescens et in regione oculorum pilis læte flavis ornatus. Oculi postici mediocres (in linea levissime procurva), spatiis diametro oculi circiter duplo latioribus sejuncti. Oculi medii antici lateralibus duplo majores. Clypeus dimidio diametro oculorum anticorum angustior. Abdomen breviter ovatum, flavo-testaceum. Sternum et partes oris pallide testacea. Pedes longi, luridi, flavido pubescentes, tibiis annulis albido-pilosis ornatis, longissime et numerose nigro-aculeati, patellis muticis, tibiis anticis aculeis inferioribus 2-2 lateralibus 2-2 et dorsalibus 2 (dorsali prima reliquis multo debiliore), metatarsis anticis prope basin aculeis quatuor subcontiguis, paulo ante medium aculeis quatuor similibus sed

in parte apicali omnino muticis. Pedes-maxillares fulvi, tarso nigro-æneo fulvo-piloso, patella paulo longiore quam latiore parallela, tibia patella multo longiore graciliore, subtereti, intus prope basin aculeo longo munita, extus ad apicem apophysi parum longa antice oblique directa, ad basin crassa sed valde attenuata ad apicem subacute et minutissime uncata, tarso magno longe ovato depressiusculo, bulbo lamina apicali magna contorta et carinata munito.

Haut Amazone : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

7. Macrinus atomarius *sp. nov.*, ♂ long. 7mm5

Cephalothorax pallide luridus, prope marginem minute fusco-notatus, linea media fusca antice divisa et evanescente ornatus. Oculi postici sat magni nigro-marginati, spatiis diametro oculi haud duplo latioribus sejuncti. Oculi medii antici lateralibus haud duplo majores. Clypeus dimidium diametrum oculorum anticorum saltem æquans. Abdomen breviter ovatum, pallide flavo-testaceum, supra parce et inordinate fusco-punctatum. Sternum et laminæ albido-testacea. Pars labialis leviter infuscata. Pedes longissimi, valde inæquales, pallide luridi, ad radicem aculeorum olivaceo-guttulati, longe et numerose nigro-aculeati. Aculei ut in præcedenti sed patellæ cunctæ biaculeatæ et aculei dorsales duo tibiarum anticarum æquales. Pedes-maxillares luridi tarso infuscato, patella longiore quam latiore leviter fusiformi, tibia patella multo longiore graciliore et tereti, prope basin aculeis tribus munito, extus in parte basilari apophysi maxima oblique divaricata nigra, extus convexa intus plana et carinata, ad marginem inferiorem prope basin obtuse truncata cum angulo superiore breviter et acute producto, tarso magno longe attenuato depressiusculo.

Brésil : Tijuca près Rio (Gounelle).

8. Macrinus longipes *sp. nov.*, ♂ long. 7mm.

Cephalothorax fulvo-rufescens, parce et longe flavido-pubescens. Oculi postici mediocres, spatiis diametro oculi duplo latioribus sejuncti. Oculi medii antici lateralibus duplo majores. Clypeus dimidio diametro oculorum anticorum angustior. Abdomen sternum partes oris coxæque fulvo-testacea. Pedes longi, fulvo-rufescentes, graciles, valde inæquales, longe nigro-aculeati.

Aculei fere ut in *M. succineo* sed tibiæ anticæ aculeo dorsali unico tantum armatæ, patellæ haud aculeatæ. Pedes-maxillares fulvi, patella longiore quam latiore parallela, tibia patella paulo longiore et angustiore, teretiuscula, extus ad apicem apophysi nigra articulo non multo breviore, antice directa, ad basin sat crassa, dein gracillima, leviter curvata et acutissima, tarso magno, tibia cum patella longiore, longe ovato ad apicem longe attenuato, bulbo disciformi lamina crassa et stylo valido bicircumdato.

Haut Amazone : Fonteboa.

Sectio **Sparianthidi.**

Type gen. *Sparianthis* E. Sim.

Cette section se compose de trois genres dont le tableau suivant résume les caractères :

1. Lineæ oculorum duæ recurvæ. Tibiæ anticæ aculeis longissimis pronis saltem 6-6 subtus instructæ........................ *Sparianthis*.
   Lineæ oculorum procurvæ. Tibiæ anticæ aculeis longissimis pronis 3-3. 3-4 (rarissime 5-5) subtus instructæ........................ 2.
2. Tarsi saltem antici valde compressi et superne convexi. Metatarsi antici subtus prope basin aculeis longissimis binis tantum armati.. *Stasina*.
   Tarsi cuncti graciles et teretes. Metatarsi antici subtus 3-3 longe aculeati.............................. *Pseudosparianthis*.

Genus PSEUDOSPARIANTHIS nov. gen.

Gen. *Sparianthi* valde affinis, differt oculis posticis lineam procurvam formantibus, mediis inter se quam a lateralibus paulo remotioribus, oculis anticis in linea æqualiter procurva, mediis lateralibus majoribus, tibiis anticis aculeis inferioribus 3-3 vel 3-4, metatarsis aculeis 2-2 vel 3-3 tantum armatis.

9. PSEUDOSPARIANTHIS FUSCA *sp. nov.*, ♀ (pullus) long. 9^{mm}.

Cephalothorax crassus, postice valde convexus et tumidulus, antice longe declivis, obscure fulvo-olivaceus vel rufescens, versus marginem leviter infuscatus, nigro-setosus et parce fulvo-pilosus. Oculi postici in linea valde procurva, medii lateralibus vix minores et inter se quam a lateralibus vix remotiores. Oculi antici in linea sat procurva, spatiis diametro mediorum saltem haud

angustioribus distantes. Area mediorum multo latior quam longior. Abdomen ovatum, postice acuminatum, fusco-testaceum, sat longe fulvo-pubescens. Sternum, chelæ pedesque obscure fulva. Tibiæ anticæ aculeis longissimis leviter elevatis et pronis 3-3, metatarsi aculeis similibus 2-2 instructi sed aculeis lateralibus carentes (vulvæ haud plane adulta).

Amazone : Rio Tocantins (de Mathan).

10. Pseudosparianthis pictus *sp. nov.*, ♂ long. 8mm.

Cephalothorax humilis, planus, postice vix convexus, obscure fulvo-rufescens, versus marginem leviter fusco-reticulatus, regione oculorum infuscata, lævis, parce nigro et fulvo-pilosus. Oculi postici in linea leviter procurva, medii lateralibus minores et inter se quam a lateralibus evidenter remotiores. Oculi antici in linea leviter procurva, spatiis diametro mediorum angustioribus inter se distantes. Area oculorum mediorum non multo latior quam longior. Clypeus niger. Abdomen oblongum, postice valde acuminatum, lurido-testaceum, punctis nigris paucis, lineas transversas valde anguloso-arcuatas 3-4 parum regulares formantibus, supra ornatum. Sternum pallide testaceum. Partes oris leviter infuscatæ. Chelæ antice fuscæ, intus et subtus fulvæ. Pedes pallide fusco-rufescentes, coxis, tarsis femoribusque in parte basilari dilutioribus et fulvis. Tibiæ et metatarsi antici inferne aculeis longissimis pronis 3-4 atque aculeis lateralibus armati. Pedes maxillares fulvi, articulis ultimis infuscatis, patella fere 1/3 longiore quam longiore, tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi nigra brevi crassa et leviter uncata armata, tarso maximo late ovato et obtuso, ad marginem exteriorem crasse marginato, bulbo complicato validissime convexo.

♀ long. 8mm5. — Cephalothorax luridus linea marginali et utrinque prope marginem maculis parvis ramosis fuscis notatus. Pedes fulvo-rufescentes coxis tarsis femoribusque ad basin dilutioribus, tibiis metatarsisque anticis leviter infuscatis, aculeis inferioribus ut in mare sed aculeis lateralibus nullis. Plaga vulvæ longior quam latior subparallela, antice fovea fulva transversa, postice parte longitudinali fulva angusta et leviter sulcata sed postice paululum incrassata et utrinque plagula nigra marginata notata.

Haut Amazone : Pevas, S. Paulo de Olivença (de Mathan).

Genus STASINA E. Sim., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 90.

Ce genre, que nous avons rapporté avec doute à la famille des *Drassidæ*, appartient réellement à celle des *Sparassidæ* et vient se placer à côté du genre *Sparianthis* E. Sim. Il en diffère cependant par ses deux lignes oculaires courbées en arrière et ses tarses comprimées et convexes en dessus. L'espèce type *S. lineata* E. Sim. est propre aux îles Philippines, nous avons reçu depuis l'espèce suivante :

11. Stasina americana *sp. nov.*, ♀ (pullus) long. 5mm.

Cephalothorax fulvo-rufescens, marginem versus leviter infuscatus, linea marginali exili, in parte cephalica lineis fuscis V formantibus, in parte thoracica utrinque lineis devaricatis abbreviatis fuscis 2 vel 3 ornatus. Abdomen angustum antice obtuse truncatum, postice longe attenuatum, supra albido-testaceum crebre fusco-punctatum et in parte secunda punctis majoribus vel lineis abbreviatis transversis 5 vel 7 uniseriatis notatum. Venter, sternum, partes oris, pedes-maxillares, pedesque fulvo testacea, tibiis metatarsique anticis infuscatis, posticis confuse annulatis.

Brésil : Tijuca près Rio (Gounelle).